

Provtagning för sexuellt överförda infektioner

Rekommenderad provtagning utifrån anamnes

STI	KLAMYDIA, GONORRE (kombotest)	HEPATIT B	HEPATIT C	HIV	SYFILIS	MYCOPLASMA	HERPES	KOMMENTAR
Tidigaste tid för provtagning efter smittotillfälle (tidigare om symtom).	7 dagar	Vid första besöket. Säkert negativt först 6 månader efter exponering.		Vid första besöket + 6 veckor efter exponering (12 veckor vid misstanke om hiv 2*).	1-2 veckor efter smittotillfälle. Säkert negativt först 3-4 månader efter exponering.	10 dagar	Vid symtom	Hiv 2 förekommer framförallt i Västafrika, Portugal och Frankrike.
Provtagningslokaler	Enligt sexuell praktik. Ta prov från till exempel urin, vagina, cervix, svalg, rektum.	Blodprov (serologi)		Blodprov (serologi)	Blodprov (serologi)	Urinprov för män, vaginalprov för kvinnor	Blåsskrap	
Har eller haft sex mot ersättning				●				
Har eller har haft MSM*-kontakter	●	●	◐	●	●			Prov från svalg, urin och rektalt samt blodprov. Hep C tas 1 gång per år.
Har haft sex utomlands	●	●		●	●	◐		Sjukdomar har olika förekomst i olika länder.
Har eller har haft urinvägsbesvär	●					●		Eventuell urinodling hos kvinnor om STI uteslutits.
Har eller haft flytningar	●					●		
Har eller har haft blödning i samband med samlag	●					●		Om STI uteslutits, undersökning av läkare för uteslutande av malignitet.
Har eller har haft ont nedtill i buken eller underlivet	●					●		Undersökning av läkare vid behov.
Har sår, utslag, blåsor, klåda eller smärta i underlivet	●				Vid typiskt sår och hos MSM	●	●	Eventuell undersökning av läkare (syfilissår kan också förekomma oralt).
Har svullna lymfkörtlar	●			●	◐	●	●	Eventuell undersökning av läkare. OBS! LGV (klamydia) rektalt.
Har ögonbesvär eller ensidig konjunktit	●						◐	Prov tas från nede ögonlocket. Remittera eventuellt till ögonläkare.
Allmänfarlig, anmälnings- och spåringspliktig enligt smittskyddslag	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nej	Nej	Om ja, undersökning och behandling gratis för patienten.
Vid positivt prov	Klamydia Partnerbehandling efter provtagning oavsett provsvar. Svar behöver inte inväntas. Gonorre Remiss till venerologmottagning.	Remiss till infektionsmottagningen, samma eller nästföljande dag. Gäller även vid stark misstanke för hepatit B-smitta.		Ta direktkontakt med infektionsmottagningen. Vid stark misstanke om smitta, kontakta infektionsmottagningen samma eller nästföljande dag.	Remiss till venerologmottagningen.	Vid påvisad eller ej bedömd antibiotikaresistens remittera till venerologmottagningen. Överväg alltid partnerbehandling till fast partner. Tillfällig partner behandlas efter positivt provsvar.		Anmälan av diagnosticerad infektion skrivs i SmiNet .
Annat <i>Patient som önskar provtagning för anmälningspliktig STI ska inte nekas!</i>	Klamydia: Vid positivt prov analt, tänk LGV.	MSM* ska erbjudas vaccination mot hepatit A och B. Kan remitteras till venerologmottagningen.				Kontrollprov minst 4 veckor efter avslutad behandling om fortsatta besvär. Om positivt, ny kontroll efter ytterligare 1-2 veckor, därefter remiss till venerologmottagningen.		Se Handläggning STI Region Uppsala .

Symtom

*MSM = män som har sex med män