

Falldefinition

Vårdrelaterad infektion (VRI)

1. **Varje infektion som bedöms ha samband med ett tidigare ingrepp eller en behandling, oberoende av i vilken vårdform ingreppet eller behandlingen utförts eller ordinerats.**

A. Postoperativ infektion

Ytlig eller djup infektion i operationsområdet som debuterar inom 30 dagar efter kirurgi utan implantat eller inom 1 år efter kirurgi med implantat.

B. Övrig ingreppsrelaterad infektion

Infektion som kan relateras till tidigare eller pågående användning av kateter, kärlinfart, dränage, intubation, punktion, injektion med flera åtgärder som bryter eller försvagar kroppens naturliga infektionsbarriärer.



Region Uppsala

Falldefinition

Vårdrelaterad infektion (VRI)

C. Läkemedelsrelaterad infektion

Infektion som uppkommer till följd av

- direkt läkemedelsverkan, till exempel *Clostridioides difficile*-enterit i samband med användning av antibiotika.
- läkemedelseffekt på infektionsförsvaret. Till exempel vid behandling med cytostatika, immunhämmare eller kortison.

2. Varje infektion som debuterar två dygn eller mer (≥48 timmar) efter inskrivning inom slutenvården oberoende av tidigare vård eller behandling.

3. Varje infektion som debuterar inom två dygn efterutskrivning från slutenvård.

Bärarskap av olika typer av smittämnen (exempelvis MRSA, VRE, ESBL) utan infektionstecken ska **inte** betraktas som vårdrelaterad infektion.

Vårdhygien och infektionspreventionsenheten, Ledningskontoret, Region Uppsala. Utgåva 2025-12.



Region Uppsala