

Smittsam magsjuka

	Påstående	Sant	Falskt
1	Vinterkräksjuka uppträder bara på vinterhalvåret		
2	Smittämnet finns i avföring och kräkning		
3	Åtgärder för att förhindra smittspridning måste vidtas direkt vid kräkning eller diarré hos vårdtagare		
4	Kohortvård är bara effektiv om den bedrivs 24 timmar per dygn		
5	Inkubationstiden är ca 1 vecka		
6	Viruset kan överleva på ytor länge		
7	Dödligheten ökar för riskgrupper under perioder med hög förekomst av magsjuka i samhället		
8	Personal får gå mellan avdelningar om de tvättar händerna noggrant först		
9	Personal är endast smittsam om de har symtom		
10	Viruset smittar via luften vilket gör att alla ska använda munskydd		
11	Det är viktigt att invänta provsvar så att vårdtagare inte behöver stanna i sin lägenhet i onödan.		
12	Skorna är en av de största smittspridarna därför ska personalen använda skoskydd.		
13	Kohortvårdspersonal får vistas i avdelningskök		
14	Även om utbrottet pågår länge får fysioterapeuter och arbetsterapeuter aldrig besöka enheter med pågående magsjuka		
15	Vid friskförklaring räcker det att vårdtagaren får rena kläder.		
16	För att insjukna måste viruset passera munnen		
17	Rengöring och desinfektion har betydelse för smittspridningen		
18	Vid misstänkt vinterkräksjuka införs utökade hygienrutiner		
19	Personal som varit magsjuk kan återgå i tjänst tidigast efter 24 timmar från sista symtom		