

Smittsam magsjuka

	Påstående	Sant	Falskt
1	Vinterkräksjuka uppträder bara på vinterhalvåret.		X
2	Smittämnet finns i avföring och kräkning.	X	
3	Åtgärder för att förhindra smittspridning måste vidtas direkt vid kräkning eller diarré hos vårdtagare.	X	
4	Kohortvård är bara effektiv om den bedrivs 24 timmar per dygn.	X	
5	Inkubationstiden är cirka 1 vecka.		X
6	Viruset kan överleva på ytor länge.	X	
7	Dödligheten ökar för riskgrupper under perioder med hög förekomst av magsjuka i samhället.	X	
8	Personal får gå mellan avdelningar om de tvättar händerna noggrant först.		X
9	Personal är endast smittsam om de har symtom.	X	
10	Viruset smittar via luften vilket gör att alla ska använda munskydd.		X
11	Det är viktigt att invänta provsvar så att vårdtagare inte behöver stanna på rummet i onödan.		X
12	Skorna är en av de största smittspridarna därför ska personalen använda skoskydd.		X
13	Kohortvårdspersonal får vistas i avdelningskök		X
14	Även om utbrottet pågår länge får fysioterapeuter och arbetsterapeuter aldrig besöka enheter med pågående magsjuka.		X
15	Vid friskförklaring räcker det att vårdtagaren får rena kläder.		X
16	För att insjukna måste viruset passera munnen.	X	
17	Rengöring och desinfektion har betydelse för smittspridningen.	X	
18	Vid misstänkt vinterkräksjuka införs utökade hygienrutiner.	X	
19	Personal som varit magsjuk kan återgå i tjänst tidigast efter 24 timmar från sista symtom	X	