

## Smittsam magsjuka

	<b>Påstående</b>	<b>Sant</b>	<b>Falskt</b>
1	Vinterkräksjuka uppträder bara på vinterhalvåret		
2	Smitt dosen anses vara så låg som ett tiotal viruspartiklar		
3	Inkubationstiden är ca 1 vecka		
4	Städningen har ingen betydelse för smittspridningen		
5	Kohortvård är bara effektiv om den bedrivs 24 tim per dygn		
6	Smittämnet finns i avföringen		
7	Viruspartiklarna behåller sin smittsamhet utanför kroppen under lång tid		
8	Dödligheten ökar inom äldreomsorgen under perioder med hög förekomst av magsjuka i samhället		
9	Personal får gå mellan avdelningar om de tvättar händerna noggrant först		
10	Personal är endast smittsam om de har symtom		
11	Viruset smittar via luften vilket gör att alla borde bära munskydd		
12	Det är viktigt att invänta provsvar så att man inte isolerar vårdtagare i onödan		
13	Skorna är en av de största smittspridarna, lägg därför ut indränkta underlägg med ytsprit som personalen kan trampa på		
14	Enheten anses smittfri efter 48 timmars symtomfrihet hos samtliga vårdtagare och personal		
15	Även om utbrottet pågår länge får fysioterapeuter och arbetsterapeuter aldrig besöka enheter med pågående magsjuka		
16	Tvätt ska ske i minst 60°C		
17	För att insjukna måste viruset passera munnen		
18	Ett negativt provsvar utesluter inte vinterkräksjuka		
19	Vid misstänkt vinterkräksjuka införs tillägg till basala hygienrutiner		
20	Personal som varit magsjuk ska inte återgå i tjänst förrän 24 timmar efter sista symtom		