

Preparat (substans, ATC-kodsordning)			Antacida (Novaluzid mm)	Fe Ca Mg		
Doxyferm, Oracea (doxycyklin)	+/-	*	X	X	X	X
Tetralysal (lymecyklin)	+	*	X	X		X
Tetracyklin (tetracyklin)	-	*	X	X		X
Amimox, Imacillin (amoxicillin)	+/-					
Selexid, Penomax (pivmecillinam)	+	*				
Kåvepenin, Tikacillin, (fenoximetylpenicillin)	Vuxna- Barn+ (pga smaken)					
Heracillin (flukloxacillin)	-					
Bioclavid, Spektramox (amoxicillin + klavulansyra)	+					
Cefamox (cefadroxil)	+					
Ery-Max, Abboticin (erytromycin)	+					
Surlid (roxitromycin)	-					
Klacid (klaritromycin)	+/-					
Azitromax (azitromycin)	+/-		X			(X)
Ketek (telitromycin)	+/-					
<p> +: Med måltid -: 1 h före eller 2 h efter måltid <i>(varierar något mellan preparat, se FASS för exakt tid)</i> +/-: Behandlingen är oberoende av måltid, magbiverkningar kan dock lindras vid intag med mat *: Sväljes med <i>minst</i> ½ glas vatten, i upprätt läge, inte liggande X Alkohol ska undvikas X Risk för fotosensibilisering (X) hudirritation av starkt solljus <i>sällsynt biverkning</i> Antacida X Antacida bör undvikas alt tidpunkt för intag anpassas Fe,Ca,Mg X Järn, Calcium, Magnesium bör undvikas alt tidpunkt för intag anpassas </p>						

Preparat (substans, ATC-kodsordning)			Antacida (Novaluzid mm)	Fe Ca Mg		
Dalacin (klindamycin)	+/-	*				
Idotrim (trimetoprim)	+/-					(X)
Bactrim, Eusaprim (trimetoprim + sulfametoxazol)	+/-					(X)
Ciproxin (ciprofloxacin)	+/-		X	X		X
Norfloxacin (norfloxacin)	-		X	X		(X)
Tavanic (levofloxacin)	+/-		X	X		X
Avelox (moxifloxacin)	+/-		X	X		X
Vancocin (vankomycin)	+/-					
Fucidin (fusidinsyra)	-					
Flagyl (metronidazol)	+/-				X	
Fasigyn (tinidazol)	+				X	
Furadantin (nitrofurantoin)	+					
Hiprex (metenamin)	+/-		X			
Zyvoxid (linezolid)	+/-				X	
Rimactan, Rifadin (rifampicin)	-		X			
Ansatipin (rifabutin)	+/-					
Tibinide (isoniazid)	-		X		X	
Myambutol (etambutol)	+/-			X		
Rimactazid (rifampicin + isoniazid)	-		X		X	
Rimcure (rifampicin + pyrazinamid + isoniazid)	-		X		X	
Rimstar (rifampicin + pyrazinamid + isoniazid + etambutol)	-		X	X	X	
<p> Region Uppsala Kontakta farmaceut för information om vilka preparat som <i>skall</i> respektive <i>bör</i> sväljas hela samt får delas, tuggas eller krossas Källa: FASS Uppdaterad januari 2017 </p>						