




Perorala antibiotika i kombination med mat och läkemedel


Substans [Exempel på preparat]		H ₂ O	A	Fe		
amoxicillin (Amimox®, Imacillin®)	+/-					
amoxicillin + klavulansyra (Bioclavid®, Spektramox®)	+					
azitromycin (Azitromax®)	+/-		-			(-)
cefadroxil (Cefamox®)	+					
cefixim (Suprax®)	+/-					
ceftibuten (Wincef®)	-					
ciprofloxacin (Ciproxin®)	+/-		-	-		-
doxycyklin (Doxyferm®, Oracea®)	+/-	+	-	-	-	-
erytromycin (Ery-Max®, Abboticin®)	susp: + tabl: -					
etambutol (Myambutol®)	+/-			-		
fenoximetylpenicillin (Kåvepenin®, Tikacillin®)	V:- B:+ <small>p.g.a. smak</small>					
fidaxomicin (Dificlir®)	+/-	+				

H₂O + Sväljes med minst ½ glas vatten, i upprätt läge, inte liggande.

A - Antacida bör undvikas alt. tidpunkt för intag anpassas.

Fe - Järn, Calcium, Magnesium bör undvikas alt. tidpunkt för intag anpassas.

 - Alkohol ska undvikas.

 - Risk för fotosensibilisering.
[-] Hudirritation av starkt solljus sällsynt biverkning.



+ Tas med måltid.

- Tas 1h före alt. 2h efter måltid.




+/- Behandlingen är oberoende av måltid, magbiverkningar kan dock lindras vid intag med mat.

V Vuxna

B Barn

Använd appen "Stöd vid läkemedelshantering" för information om vilka preparat som skall respektive bör sväljas hela samt får delas, tuggas eller krossas.

Källa: FASS
Uppdaterad oktober 2022

Substans (Exempel på preparat)		H ₂ O	A	Fe		
flukloxacillin (Heracillin®)	-					
fusidinsyra (Fucidin®)	-					
isoniazid (Tibinide®)	-		-		-	
klaritromycin (Klacid®)	+/-					
klindamycin (Dalacin®)	+/-	+				
levofloxacin (Tavanic®)	+/-		-	-		-
linezolid (Zyvoxid®)	+/-				-	
lymecyklin (Tetralysal®)	+	+	-	-		-
metronidazol (Flagyl®)	+/-				-	
moxifloxacin (Avelox®)	+/-		-	-		-
nitrofurantoin (Furadantin®)	+					
pivmecillinam (Selexid®, Penomax®)	+	+				
pyrazinamid (Pyrazinamide®)	+/-				-	-
rifabutin (Ansatipin®)	+/-					
rifampicin (Rimactan®, Rifadin®)	-		-			
tetracyklin (Tetracyklin®)	-	+	-	-		-
trimetoprim (Idotrim®)	+/-					(-)
trimetoprim + sulfametoxazol (Bactrim®, Eusaprim®)	+/-					(-)
vankomycin (Vancocin®)	+/-	+				