







Perorala antibiotika i kombination med mat och läkemedel




Substans (Exempel på preparat)		H ₂ O	A	Fe		
amoxicillin (Amimox [®] , Imacillin [®])	+/-					
amoxicillin + klavulansyra (Bioclavid [®] , Spektramox [®])	+					
azitromycin (Azitromax [®])	+/-		-			(-)
cefadroxil (Cefamox [®])	+					
cefixim (Suprax [®])	+/-					
ceftibuten (licens, Wincef [®])	+/-					(-)
ciprofloxacin (Ciproxin [®])	+/-		-	-		-
doxycyklin (Doxoferm [®] , Oracea [®])	+	+	-	-	-	-
erytromycin (Ery-Max [®] , Abboticin [®])	susp: + tabl: -					
etambutol (licens)	+/-		-	-	-	(-)
fenoximetylpenicillin (Kåvepenin [®] , Tikacillin [®])	V: - B: + p.g.a. smak					

H₂O	+	Sväljes med minst ½ glas vatten, i upprätt läge, inte liggande.
A	-	Antacida bör undvikas alt. tidpunkt för intag anpassas.
Fe	-	Järn, Calcium, Magnesium bör undvikas alt. tidpunkt för intag anpassas.
	-	Alkohol ska undvikas.
	(-)	Risk för fotosensibilisering. Hudirritation av starkt solljus sällsynt biverkning.

	+	Tas med måltid.
	-	Tas 1h före alt. 2h efter måltid.
	+/-	Behandlingen är oberoende av måltid, magbiverkningar kan dock lindras vid intag med mat.
V		Vuxna
B		Barn

Använd appen "Stöd vid läkemedelshandling" för information om vilka preparat som skall respektive bör sväljas hela samt får delas, tuggas eller krossas.

Källa: FASS och ev licensinformation

Substans (Exempel på preparat)		H ₂ O	A	Fe		
fidaxomicin (Dificlir®)	+/-					
flukloxacillin (Heracillin®)	-	+				
isoniazid (Tibinide®)	-		-		-	
klaritromycin (Klacid®)	+/-					
klindamycin (Dalacin®)	+/-	+				
levofloxacin (Levofloxacin®)	+/-		-	-		-
linezolid (Zyvoxid®)	+/-				-	
lymecyklin (Tetralysal®)	+	+	-	-		-
metronidazol (Flagyl®)	+/-				-	
moxifloxacin (Avelox®)	+/-		-	-		-
nitrofurantoin (Furadantin®)	+					
pivmecillinam (Selexid®, Penomax®)	+/-	+				
pyrazinamid (Pyrazinamide®)	+/-				-	-
rifabutin (Ansatipin®)	+/-				-	
rifampicin (Rimactan®)	-		-			
trimetoprim (Idotrim®)	+/-					(-)
trimetoprim + sulfametoxazol (Bactrim®, Eusaprim®)	+/-					(-)
vankomycin (Vancocin®)	+/-	+				