

Översikt av bakteriers förväntade känslighet för antibiotika vid användning i klinisk praxis. Undantag kan förekomma. Vid osäkerhet kontakta infektionsjour/-konsult.
Uppdaterad av Erik Skog, David Lennebratt och Mats Lindeborg okt 2026

 Region Uppsala Samverkan mot antibiotikaresistens  AKADEMISKA SJUKHUSET 	G+ aerob							G+ anaerob	G- aerob											G- anaerob				
	<i>S. aureus</i>	Viridansstrep. (tid. alfastraptokocker)	Betastreptokocker (grupp A, C och G)	Pneumokocker	<i>E. faecalis</i>	<i>E. faecium</i>	<i>Listeria</i>	<i>C. perfringens</i>	Meningokocker	<i>H. influenzae</i>	<i>Moraxella</i>	<i>E. coli</i>	<i>Klebsiella</i>	<i>Enterobacter</i>	<i>Proteus</i>	<i>Shigella</i> , <i>Salmonella</i>	<i>Campylobacter</i>	<i>Pseudomonas</i>	<i>Legionella</i>	<i>F. tularensis</i>	<i>Pasteurella</i>	<i>B. fragilis</i> -gruppen	<i>Mycoplasma</i> , <i>Chlamydia</i> spp.	<i>Borrelia</i>
Fenoximetylpenicillin, PcV (po)																								
Bensylpenicillin, PcG (iv)									1,2															
Pivmecillinam (po)												3	3	3	3									
Amoxicillin (po)					1				1,2			1			1									
Ampicillin (iv)																								
Amoxicillin+klavulansyra (po)					1					1	1	1	1		1									
Flukloxacillin (po)																								
Kloxacillin (iv)																								
Piperacillin+tazobaktam (iv)					1									4				1						
Cefadroxil (po)												3	3	3	3									
Ceftibuten (po)														4										
Cefuroxim (iv)														4										
Cefotaxim (iv)	1													4										
Ceftriaxon (iv)	1													4										
Ceftazidim (iv)														4				1						
Imipenem (iv)					1										1			1						
Meropenem (iv)																								
Ertapenem (iv)																								

■ = känslig ■ = osäker klinisk effekt. 1: hög dos. 2: 35-45% resistent. 3: endast vid nedre UVI. 4: inducerbar resistens kan föreligga.

Region Uppsala Samverkan mot antibiotikaresistens AKADEMISKA SJUKHUSET Region Uppsala	G+ aerob							G+ anaerob	G- aerob												G- anaerob			
	<i>S. aureus</i>	<i>Viridansstrep.</i> (tid. alfastreptokocker)	Betastreptokocker (grupp A, C och G)	Pneumokocker	<i>E. faecalis</i>	<i>E. faecium</i>	<i>Listeria</i>	<i>C. perfringens</i>	Meningokocker	<i>H. influenzae</i>	<i>Moraxella</i>	<i>E. coli</i>	<i>Klebsiella</i>	<i>Enterobacter</i>	<i>Proteus</i>	<i>Shigella, Salmonella</i>	<i>Campylobacter</i>	<i>Pseudomonas</i>	<i>Legionella</i>	<i>F. tularensis</i>	<i>Pasteurella</i>	<i>B. fragilis</i> -gruppen	<i>Mykoplasma, Chlamydia</i> spp.	<i>Borrelia</i>
Erytromycin (po/iv)																								
Azitromycin (po/iv)																								
Klindamycin (po/iv)																						5		
Doxycyklin (po)																								
Metronidazol (po/iv)																								
Ciprofloxacin (po/iv)	1,6																	1						
Levofloxacin (po/iv)	1,6		1	1														1						
Moxifloxacin (po/iv)																								
Trimetoprim (po)											3,7	3,7	3	3,7										
Trimetoprim/sulfa (po/iv)										7		7	7		7									
Nitrofurantoin (po)					3						3													
Amikacin, Gentamicin, Tobramycin (iv)																								
Vankomycin (iv)																								
Daptomycin (iv) ⁸					1	1																		
Linezolid (po/iv)																								

 = känslig  = osäker klinisk effekt. 1: hög dos. 3: endast vid nedre UVI. 5: tilltagande resistens generellt hos anaerober.
 6: Enbart vid främmandekroppsinfektioner. 7: > 20% resistenta. 8: Ej vid lungfokus.